

Tabla 2. Estudios de vida real que evalúan el empleo de FOLFIRI/aflibercept

	QoLITRAP	Spanish NPP	GITUD	Spanishhospitals
Nº of pacientes	839	71	78	120
Diseño	Estudio no intervencionista para valorar resultados eficacia y de QoL en 2L y 3L	Estudio observacional, retrospectivo	Estudio observacional, retrospectivo	Estudio observacional retrospectivo, de pacientes RAS WT tratados con antiEGFR en 1L
Criterios de inclusión	PS0-2	PS0-1	Progresión tras un regimen previo de oxaliplatino. PS0-2	Progresión tras 1 línea previa de oxaliplatino+antiEGFR PS0-2
% Prev. Bevacizumab	56,7	60,6	47,4	-
% Prev. anti-EGFR	15,3	22,5	12,8	100
QoL	Mantenida	NR	NR	-
SG	NR	NR	12,0	14,5
Prev anti-EGFR	NR	NR	11,9	14,5
Prev. bevacizumab	NR	NR	10,8	-
SLP	8,3 (2L)	5,3	6,8	6,9
Prev. anti-EGFR	7.6 (2L)	2,6	4,9	6,9
Prev.bevacizumab	8,3 (2L)	6,4	6,8	-
TR	20%	19,7%	21,8%	33%

QoL:calidad de vida; Prev. Bevacizumab: Bevacizumab previo; Prevanti-EGFR:antiEGFRprevio;SLP :supervivencia libre de progresión; 2L:segunda línea;NR:no reportado